



BECK Anxiety Inventory

BAI SE

Beck Anxiety Inventory: Svensk version

Tolkningsrapport

Aaron T. Beck

Namn:	Test Person
Ålder:	22
Kön:	Kvinna
Utbildning:	Universitet
Yrke:	Student
Testledare:	Testleder
Testdatum:	06/05/2022

Copyright © 2009 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. Swedish translation copyright © 2017 NCS Pearson, Inc. Adapted and reproduced by Pearson Sweden AB under license from Pearson Inc. All rights reserved.


BAI, Beck Anxiety Inventory, and Pearson, are trademarks in the U.S. and/or other countries of Pearson Education, Inc., or its affiliate(s).

Denna rapport innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Behörig användare har rätt att, i enlighet med citaträtten (2 kap. 22 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729) och för infogande i sitt professionella utlåtande, göra de utdrag ur rapporten som krävs för att på ett adekvat sätt återge de huvudsakliga slutsatserna. Det är inte tillåtet att översätta, anpassa eller konstruera specialversioner av själva rapporten utan tillstånd från Pearson.

[1.1 / 2 / QG]

Resultatsammanställning

Grafen och tabellen presenterar testpersonens *T*-poäng baserat på resultat i normgruppen. Utifrån detta estimeras allvarlighetsgraden av testpersonens ångestrelaterade symtom. *T*-poäng 50 är medelvärdet i normgruppen (standardavvikelsen = 10 *T*-poäng).



Råpoäng:	21
<i>T</i> -poäng:	77
Percentil:	97.2
Kategori:	Måttlig

Tolkning

Test Person rapporterar en måttlig nivå av ångestrelaterade symtom. Denna grad av ångest kan påverka patientens vardagliga fungerande, såväl känslö- som beteendemässigt, genom att ångest stör tankeprocesser och interaktion med omgivningen. Givet sambandet mellan ångest och depression, kan testledaren överväga att även administrera *Beck Depression Inventory 2*.

För att en statistiskt signifikant* förändring ska ha skett mellan olika testtillfällen, måste vid uppföljning den totala poängen på BAI vara över 24 eller under 15.

*90 % konfidensintervall, kontrollerat för regression mot medelvärdet och testets reliabilitet.

Rapporterade symtom

Test Person rapporterar följande upplevelserelaterade och panikrelaterade symtom:

4. Oförmåga att slappna av. (Svår)
5. Rädsla att det värsta ska hända. (Lindrig)
9. Skräckkänslor. (Lindrig)
10. Nervositet/oro. (Måttlig)
14. Rädsla att förlora kontrollen. (Måttlig)
17. Rädsla. (Lindrig)

Test Person rapporterar följande somatiska (fysiologiska och/eller autonoma) symtom:

1. Domningar eller stickningar. (Lindrig)
3. Darrning i benen. (Måttlig)
8. Ostadighetskänslor. (Lindrig)
12. Darrning i händerna. (Lindrig)
18. Illamående eller obehag i magen. (Svår)
19. Svimmingskänsla. (Måttlig)
21. Svette (inte på grund av värme). (Lindrig)

Rapporten slutar här